No. 64,

Observation sur une tumeur molle qui avait son siège dans la région iliaque gauche entre les muscles du bas ventre et le péritoine

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Un grenadier du régimt de Touraine en garnison à metz, arriva à l'hopital militaire dans le commencemt du mois de Juin. il se plaignait d'une douleur à la région iliaque gauche. on lui administra de doux purgatifs et il prit une quinzaine de bains qui déclarerent cette tumeur. Comme il y avait du contenu l'on fit une incision qui donna issue à plus d'une pinte de pus; mais la fievre qui s'empara du malade le fit perir au bout de trois semaines après avoir violemment souffert.

Je l'ouvris. la tumeur etait circonscripte elle s'étendait jusqu'au petit bassin et avait son siége entre les muscles du bas ventre et le péritoine le séjour du pus avait rongé la veine spermatique une des causes principales de l'hémorragie qui eut lieu quelques jours avant sa mort. le plus considerable de cette tumeur etait adossé sur l'S que

ARC52 n°125

formé le Colon elle était du volume d'une
tête D'adulte et pésait environ quatre livre
le séjour du pus et son acrimonie avait rongé
le psoas, L'iliaque, et en passant sous l'arcade
formé par l'anneau des muscles du bas ventre
avait aussi rongé une partie des triceps muscles
adducteurs de la cuisse, ainsy que les 1.ères membranes
de L'artère et veine Crurale, qui toutes deux
étaient dilatées outre mesure. le rein gauche était
saine hormis le tissu cellulaire qui l'enveloppe.

les intestins étaient en bon état excepté le colon
à L'endroit ou il formait le plancher de la
tumeur, on y remarquait des tâches bleuâtres,
et une disposition a la Gangrène.

On attribue la Cause de cette tumeur
à la quantité de pillules drastiques qu'un
Charlatan célèbre à metz et dont le
malade avait usé pour cette douleur au
nombre environ de 400. Ce qui est certain
c'est qu'un Lieutenant des Grenadiers de sa
Compagnie est attaqué d'une maladie dangereuse
et qui le conduira au tombeau pour en avoir
fait usage à la dose de 300, on lui

a déja fait plusieurs ouvertures et contre ouvertures à la suite d'une tumeur qui s'est déclaré a l'articulation de la jambe avec la cuisse.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE